

HBV'li Gebelerde Takip

HBV'li Gebelerde İlk Trimester HBsAg Taraması

HBsAg Pozitif Gebelerde Değerlendirme

1. Karaciğer enzimleri, trombosit, HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA ve batin ultrasonografisi ile karaciğer boyutlarını değerlendir.
2. HBV DNA < 200.000 IU/ml ise gebede tenfovoir ile tedavi planla.

Doğum Sonrası Aşılama Prosedürü

- 1. Yeni doğana doğumdan sonraki ilk **12 saat içinde HBV aşısı (1. doz)** ve diğer koldan 0,5 ml HBIGG (pasif profilaksi) uygula.
- 2. 0, 1 ve 6. aylarda toplam 3 doz aşı yap.
- 3. Son aşıdan sonra çocuk 9. aya ulaştığında **anti-HBs** bak.

HBV DNA Durumuna Göre Tedavi

1. HBV DNA ≥ 200.000 IU/ml ise gebelik haftası 22-28 arasında tenofovir (TDF) veya TAF ile antiviral tedaviye başla.
2. Her trimesterde annenin viral yükünü, klinik durumunu, ALT ve trombosit değerlerini izle.
3. Antiviral tedavi doğum sonrası 12 haftaya kadar devam etsin.

Özel Durumlar ve Takip Prosedürleri

Daha önceki çocukta HBsAg pozitifliği veya anne HBV DNA'sı **2000-200.000 IU/ml arasında** ise koruyucu önlemleri uygula ve tedavi planla